



1.2 高斯消元法与矩阵的初等变换

主要内容:

引入

初等变换与高斯消元法

初等矩阵

方程组 $AX=b$

$$\text{其中 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\text{就是 } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

二. 初等变换与高斯消元法

齐次方程组: $AX = 0$;

非齐次方程组: $AX = b$, $b \neq 0$
(b 中至少有一分量不为零)

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

为 $AX = b$ 的解: $AX = b$ 成立.

即 x_1, \dots, x_n 使得方程组成立

问题

1. 方程组何时有解?
2. 若有解, 有多少解? 如何求出其全部解?

二. 初等变换与高斯消元法

例1. 考虑方程组的如下同解变换：

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + x_3 = -2 \end{cases}, \quad \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = -2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \end{cases}, \quad \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = -2 \\ x_2 - 3x_3 = 5 \end{cases}, \quad \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 5 \end{array} \right)$$

得一般解（无穷多组解）：

行（简化）阶梯形矩阵

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 - 2 \\ x_2 = 3x_3 + 5 \end{cases}, \quad \text{自由未知变量}$$

二. 初等变换与高斯消元法

例2. 若某方程组经同解变换化为

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = -1 \\ x_3 = 5 \end{cases} \quad \bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

显然，有唯一解.

行阶梯形矩阵

二. 初等变换与高斯消元法



例3. 若某方程组经同解变换化为

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = -1 \\ x_2 - x_3 = 5 \end{cases} \quad \bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{array} \right)$$

即

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = -1 \\ 0x_3 = 6 \end{cases} \quad \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right)$$

显然，无解.

二. 初等变换与高斯消元法

定义1: (初等变换) 矩阵的 (列) 初等变换:

- 交换两行 (列) 的位置;
- 用一非零数乘某一行 (列) 的所有元;
- 把矩阵的某一行 (列) 的适当倍数加到另一行 (列上去).

高斯消元法就是对增广矩阵实施行初等变换化为 行 (简化) 阶梯形.

例4. 是否为行 (简化) 阶梯形?

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

二. 初等变换与高斯消元法

例5. 解方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 5 \end{cases}$$

解:
$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 2 & 3 & -4 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -6 & 1 \\ 0 & 1 & -6 & 3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

无解.

二. 初等变换与高斯消元法



例6. 解方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 & + 3x_5 = -1 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 + 4x_5 = -2 \\ 3x_1 - 3x_2 - x_3 + 4x_4 + 5x_5 = -3 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + 8x_5 = 2 \end{cases}$$

解:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & -1 & 2 & 4 & -2 \\ 3 & -3 & -1 & 4 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 8 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 5 & 3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 9 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

二. 初等变换与高斯消元法

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 + x_2 - 7x_5 \\ x_3 = 2 - 4x_5 \\ x_4 = -1 + 3x_5 \end{cases}, x_2, x_5 \text{任意 (自由未知量)}$$

为方程组的全部解.

二. 初等变换与高斯消元法

增广矩阵经行初等变换化为行（简化）阶梯形，
该阶梯形与方程组解的关系：

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

行（简化）阶梯形中
非零行的行数 < 未知量个数

无穷多解

二. 初等变换与高斯消元法

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

行（简化）阶梯形中
非零行的行数=未知量个数

唯一解

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

该数不为0

无解

二. 初等变换与高斯消元法

问题： 对于齐次方程组 $AX=0$?

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

行（简化）阶梯形中
非零行的行数 < 未知量个数

有非零解（无穷多解）

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

行（简化）阶梯形中
非零行的行数 = 未知量个数

只有零解（唯一解）

二. 初等变换与高斯消元法

一般地，设线性方程 $AX=b$ 的增广矩阵为：

$$(A:b) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

二. 初等变换与高斯消元法



行（列）初等变换



$$\begin{pmatrix} 1 & & & & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ & 1 & & & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{r,r+1} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \underline{d_{r+1}} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

二. 初等变换与高斯消元法



$$\left(\begin{array}{ccccccc} 1 & & & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ & 1 & & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ & & \ddots & & & & \\ & & & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{r,r+1} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \underline{d_{r+1}} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right)$$

1. $d_{r+1} \neq 0$, 无解;
2. $d_{r+1} = 0$, 有解:
 - (1) $r = n$: 有唯一解: $x_1 = d_1, x_2 = d_2, \dots, x_n = d_n$.
 - (2) $r < n$: 有无穷多组解:

二. 初等变换与高斯消元法



$$\begin{cases} x_1 = -c_{1,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{1n}x_n + d_1 \\ x_2 = -c_{2,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{2n}x_n + d_2 \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \\ x_r = -c_{r,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{rn}x_n + d_r \end{cases}$$

$x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_n$: **自由未知量**

二. 初等变换与高斯消元法



A 与 B 等价: $A \xrightarrow{\text{初等变换}} B$. 记为 $A \cong B$

矩阵等价具有以下性质:

- (1) 反身性 $A \cong A$;
- (2) 对称性 $A \cong B \Rightarrow B \cong A$;
- (3) 传递性 $A \cong B$ 且 $B \cong C \Rightarrow A \cong C$.

三. 初等矩阵

例1

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 5 & 10 & 30 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \\ 13 & 25 & 11 \end{pmatrix}$$

三. 初等矩阵

2.

$$E_i(c) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad i \text{ 行 } (c \neq 0)$$

3.

$$E_{ij}(c) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & c & \cdots & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} i \text{ 行} \\ j \text{ 行} \end{matrix}$$

三. 初等矩阵

定理: 对矩阵 A 作一次行(列)初等变换, 相当于在 A 的左(右)边乘上相应的初等矩阵.

 (“左乘行, 右乘列”)

定理的应用:

1. 若矩阵 B 是经有限次行初等变换得到的, 则存在有限个初等矩阵 E_1, \dots, E_k , 使得

$$B = E_k E_{k-1} \cdots E_1 A$$

三. 初等矩阵

2. 若矩阵 B 是经有限次列初等变换得到的, 则存在有限个初等矩阵 E_1, \dots, E_k , 使得

$$B = AE_1E_2 \cdots E_k$$

3. 若矩阵 B 是经有限次初等变换得到的, 则存在有限个初等矩阵 $P_1, \dots, P_k, Q_1, \dots, Q_t$ 使得

$$B = P_k \cdots P_1 A Q_k Q_{k-1} \cdots Q_1$$

三. 初等矩阵

例7 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} + a_{12} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} + a_{22} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} + a_{32} \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $B = (\quad)$.

- (1) P_2AP_3 (2) AP_1P_3 (3) AP_3P_1 (4) AP_2P_3

答案：(4).

初等变换与高斯消元法

初等矩阵